

Dépistage de la tuberculose (TB) dans les maisons de soins de longue durée et de retraite

Liste de contrôle pour le dépistage de la tuberculose active à l'intention des cliniciens

N'oubliez pas que les personnes âgées peuvent ne présenter aucun signe ou symptôme classique de tuberculose active. Chez eux, songez à cette maladie si vous constatez qu'ils se portent mal ou ressentent une fatigue inexplicable.

Symptôme	Oui	Non	Commentaires
Fièvre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hémoptysie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Toux qui dure plus de trois semaines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dyspnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Douleur à la poitrine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anorexie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Perte de poids involontaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sueurs nocturnes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Résultats de la radiographie pulmonaire	Oui	Non	Commentaires
Épanchements pleuraux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cavités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Changements aux extrémités des poumons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Densités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fibrose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Granulomes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Infiltrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nodules	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Perte de volume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adénopathie hilare ou médiastinale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Référence : ministère de la Santé et des Soins de longue durée. *Tuberculosis Protocol* (version 1.0). *Diagnostics*. P. 55; Agence de la santé publique du Canada et The Lung Association (2007). Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse (7^e éd.), chapitre 3 – Le diagnostic de la tuberculose active et la phamacorésistance. P. 45

Si l'examen des symptômes ou la radiographie pulmonaire donnent des résultats préoccupants, il y a lieu d'ordonner le prélèvement de trois échantillons d'expectorations aux fins d'analyse (bacilles acidorésistants et culture), à au moins huit heures d'intervalle, afin d'écartier la tuberculose active.