

Dépistage de la tuberculose (TB) dans les maisons de soins de longue durée et de retraite

Recommandations pour les employés et les bénévoles

L'évaluation qui suit doit être amorcée dans les six mois qui précèdent l'entrée en fonction ou dans les 14 jours qui suivent :

Personne dont le résultat du TCT est inconnu	
Un TCT en deux étapes s'impose.	
Les tests sont négatifs.	L'un des tests est positif.
▼	▼
Aucun autre test n'est recommandé.	Allez à *Personne dont le résultat du TCT est positif.

Personne dont les résultats à des TCT antérieurs en deux étapes sont documentés		
Les deux tests étaient négatifs.		Un test antérieur était positif.
Effectués il y a plus de six mois	Effectués il y a moins de six mois	▼
▼	▼	
Un TCT en une étape s'impose. Remarque : si le résultat du TCT est positif, allez à *Personne dont le résultat du TCT est positif, ci-après.	Aucun autre test n'est recommandé.	Allez à *Personne dont le résultat du TCT est positif.

*Personne dont le résultat du TCT est positif	
Signalez la personne dont le résultat du TCT est positif au bureau de santé local.	
<ul style="list-style-type: none"> Il est recommandé de procéder à un examen physique, y compris des symptômes, et à une radiographie pulmonaire pour écarter la tuberculose pulmonaire. Remarque : la radiographie pulmonaire peut remonter aux trois derniers mois, sauf si la personne est symptomatique. Aucun autre test cutané n'est recommandé. Il faudrait informer la personne des signes et symptômes de la tuberculose pulmonaire. 	
▼	▼
<p>La personne présente des symptômes de tuberculose ou sa radiographie pulmonaire est anormale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prélevez trois échantillons d'expectorations à au moins une heure d'intervalle. La personne ne devrait pas travailler tant qu'un médecin n'a pas attesté qu'elle n'est pas atteinte d'une maladie tuberculeuse infectieuse. 	<p>La personne ne présente aucun symptôme :</p> <ul style="list-style-type: none"> Elle peut continuer à travailler pendant qu'un médecin procède à une évaluation pour écarter la tuberculose infectieuse.

Remarque : chez les personnes dont l'état affaiblit gravement leur système immunitaire, le résultat du TCT peut être négatif même si elles sont atteintes de la tuberculose. Recommandez qu'un spécialiste expert de cette maladie (p. ex., un médecin spécialiste des maladies infectieuses, un pneumologue) procède à une autre évaluation.

Remarque : les bénévoles incluent ceux qui s'attendent à travailler régulièrement au cours de la prochaine année (environ une demi-journée par semaine ou plus).

** Si l'examen des antécédents et des symptômes a donné des résultats douteux, recommandez que le personnel et les bénévoles de 65 ans ou plus fassent l'objet d'une nouvelle évaluation clinique.