

# LES **5** ÉTAPES POUR RÉAGIR À UNE SURDOSE D'OPIOÏDES

ÉTAPE

**1**



**CRIEZ**  
le nom de  
la personne.



**SECOUEZ**  
la personne par  
les épaules.

ÉTAPE

**2**




**APPELEZ LE 9-1-1**

si la personne ne réagit pas.

ÉTAPE

**3**



**ADMINISTREZ DE LA NALOXONE**

Vaporisez 1 fois dans une narine ou injectez 1 ampoule dans un bras ou dans une jambe.

ÉTAPE

**4**



**FAITES DE LA RESPIRATION DE SAUVETAGE ET/OU DES COMPRESSIONS THORACIQUES.**

ÉTAPE

**5**




**EST-CE QUE ÇA MARCHE?**

S'il n'y a **pas** d'amélioration dans les 2-3 minutes, répétez les étapes 3 & 4. **Restez avec la personne.**

**POSITION DE RÉCUPÉRATION** Si la personne respire toute seule ou si vous devez la laisser seule, placez-la dans la position de récupération.

Tête légèrement penchée vers l'arrière ..... pour ouvrir les voies respiratoires



Soutenir la tête avec la main .....

La position du genou empêche de rouler sur le ventre

## SYMPTÔMES DE SURDOSE D'OPIOÏDES

- on ne peut pas réveiller la personne
- respiration lente ou suspendue
- ronflements ou gargouillis
- lèvres et ongles bleus ou violets
- pupilles contractées ou yeux réversés
- corps flasque