

Myocardite ou péricardite après injection d'un vaccin à base d'ARNm contre la COVID-19



Quelques cas de myocardite ou péricardite (inflammation du Coeur) ont été signalés en Ontario.



La plupart des cas sont ceux d'adolescents et de jeunes adultes de sexe masculin et de moins de 25 ans qui avaient reçu leur deuxième dose.



Les personnes touchées étaient légèrement malades. Elles réagissaient bien au traitement et leur état s'améliorait rapidement.



Si vous éprouvez une douleur à la poitrine, vous avez du mal à respirer ou votre rythme cardiaque devient irrégulier dans les jours qui suivent la vaccination, cherchez à obtenir des soins médicaux.



Le vaccin de Pfizer-BioNTech est privilégié chez les personnes de moins de 25 ans. Celles-ci risquent davantage de subir une myocardite ou une péricardite lorsqu'elles reçoivent le vaccin de Moderna.

L'infection au virus de la COVID-19 peut endommager le cœur. Bien que le vaccin de Moderna soit approuvé pour les personnes de moins de 25 ans, celui de Pfizer est le produit privilégié aux personnes de ce groupe d'âge. Les personnes de 18 à 25 ans qui choisissent de recevoir le vaccin de Moderna doivent donner un consentement éclairé et comprendre le risque accru de myocardite ou de péricardite qu'elles courrent. La vaccination est fortement recommandée : ses avantages dépassent les risques.

Septembre 2021