

Gestion d'une personne symptomatique qui N'a PAS été exposée à un risque élevé et (ou) qui n'a PAS été identifiée comme un contact à risque élevé

Les symptômes correspondent-ils à la COVID-19 ([consulter l'outil de dépistage](#))?

OUI



La personne doit s'isoler à la maison. Si la personne malade ne peut pas s'isoler des autres membres du foyer (p. ex., si elle est jeune), le parent ou le tuteur s'isole avec l'enfant à l'écart des membres du foyer.

Les contacts familiaux de la personne malade (par exemple, frères et sœurs, parents, colocataires, etc.) qui ne sont pas entièrement vaccinés¹ ou qui n'ont pas reçu de résultat positif à un test de la COVID-19² doivent s'isoler en attendant le résultat du test de dépistage de la COVID-19 ou les directives d'un fournisseur de soins de santé.

NON



En général, toutes les personnes malades présentant des symptômes de maladie, y compris celles dont les symptômes ne figurent pas dans l'outil de dépistage, devraient rester à la maison et s'absenter de l'école, du service de garde, conformément à la politique habituelle de l'école ou des services de garde, et consulter leur fournisseur de soins habituel. Suivre les recommandations du fournisseur de soins de santé, et passer le test de dépistage de la COVID-19 si nécessaire.

Le test de la COVID-19 est recommandé

Le test de la COVID-19 est recommandé par l'outil de dépistage, le Centre d'évaluation de la COVID-19 ou le fournisseur de soins.

La personne malade subit un test:

- Elle doit s'isoler en attendant le résultat du test.
- Si le résultat est NÉGATIF, elle peut retourner à l'école, au service de garde ou au travail si elle répond oui à **TOUTES** les questions suivantes :
 - N'a pas eu d'exposition à risque élevé et on ne lui a pas conseillé de continuer de s'isoler.
 - N'a pas de fièvre sans prendre de médicaments pour la faire baisser.
 - Les symptômes s'améliorent depuis au moins 24 heures (et (ou) 48 heures après le dernier épisode de vomissements/diarrhée).
- Si le résultat est NÉGATIF et les symptômes persistent ou s'aggravent, la personne malade doit continuer de s'isoler à la maison et s'absenter de l'école, du service de garde ou du travail, et consulter un fournisseur de soins de santé. Un nouveau test de la COVID-19 peut être envisagé.
- Si le résultat est POSITIF, la personne continue de s'isoler. La Santé publique communiquera avec elle pour lui indiquer la marche à suivre.



La personne malade n'est pas testée/ne cherche pas à se faire tester/ne consulte pas un fournisseur de soins :

- La personne malade doit s'isoler pendant 10 jours à partir du premier jour où les symptômes ont commencé.
- Les contacts familiaux de la personne malade doivent s'isoler pendant 10 jours à compter de la rupture de contact (par exemple, le dernier contact) avec la personne malade, à moins qu'ils ne soient entièrement vaccinés ou qu'ils aient obtenu un résultat précédemment positif. S'il n'y a pas de rupture de contact, (par exemple, le parent prend soin d'un enfant malade) l'isolement commencerait à la fin de la période d'isolement de personne malade.
- La personne peut retourner à l'école, au service de garde ou au travail après la période d'isolement si elle répond oui à **TOUTES** les questions suivantes :
 - N'a pas eu d'exposition à risque élevé et on ne lui a pas conseillé de continuer de s'isoler.
 - N'a pas de fièvre sans prendre de médicaments pour la faire baisser.
 - Les symptômes s'améliorent depuis au moins 24 heures (et (ou) 48 heures après le dernier épisode de vomissements/diarrhée).
- Si les symptômes persistent ou s'aggravent après la fin de l'isolement, la personne malade doit continuer à rester à la maison et s'absenter de l'école, du service de garde ou du travail, et consulter un fournisseur de soins de santé.

Le test de la COVID-19 n'est pas recommandé

Le test de la COVID-19 n'est pas recommandé par l'outil de dépistage, le Centre d'évaluation de la COVID-19 ou la personne a un autre diagnostic donné par un fournisseur de soins de santé.

La personne malade peut retourner à l'école, au service de garde ou au travail si elle répond oui à **TOUTES** les questions suivantes :

- N'a pas eu d'exposition à risque élevé et on ne lui a pas conseillé de continuer de s'isoler.
- N'a pas de fièvre sans prendre de médicaments pour la faire baisser.
- Les symptômes s'améliorent depuis au moins 24 heures (et (ou) 48 heures après le dernier épisode de vomissements/diarrhée).

Si les symptômes persistent ou s'aggravent, la personne malade doit rester à la maison, s'absenter de l'école, du service de garde ou du travail et consulter un fournisseur de soins de santé pour obtenir ses recommandations. Suivre les recommandations du fournisseur de soins de santé, y compris le test de la COVID-19 si nécessaire.

¹ Une personne entièrement vaccinée contre la COVID-19 a reçu sa deuxième dose d'une série de deux doses de vaccins contre la COVID-19 depuis au moins 14 jours. Les personnes immunodéprimées qui sont entièrement vaccinées sont exclues de cette définition, conformément au document [Personnes entièrement vaccinées contre la COVID-19 et précédemment positives](#).

² Une personne précédemment positive est une personne qui a reçu un résultat positif au test de la COVID-19 confirmé par un test par PCR. Également, son résultat positif initial a été obtenu il y a 90 jours ou moins ET elle a obtenu son congé après son infection initiale. Les personnes qui sont immunodéprimées sont exclues de cette définition, conformément au document [Personnes entièrement vaccinées contre la COVID-19 et précédemment positives](#).

le 25 septembre, 2021